



# ВИЧ и СПИД



Глобальная эпидемия ВИЧ-инфекции (вируса иммунодефицита человека) затронула все страны мира. Более 33 млн. человек инфицировано ВИЧ, из которых 17,5 млн. – женщины и 2,3 млн. – дети в возрасте до 15 лет. Ежегодно ВИЧ-инфекция поражает более 500 тыс. детей и около 400 тыс. детей умирают от СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита). Более 10 млн. детей в возрасте до 15 лет уже потеряли одного или обоих родителей, умерших от СПИДа.

ВИЧ-инфекция все чаще поражает молодежь. Более 40% всех новых случаев инфицирования ВИЧ приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Особенно уязвимы молодые женщины.

На 01.10.2011г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 12 648 случаев ВИЧ-инфекции. Около 62% инфицированных составляют молодые люди до 29 лет. Доля женщин среди новых случаев инфицирования в 2011 году превысила 47%, а доля заразившихся через половые контакты достигла 75,6%. У ВИЧ-положительных женщин родилось 1909 детей, в том числе в 2011 году – 130.

При проникновении в организм ВИЧ со временем разрушает иммунную систему, защищающую человека от болезней. Своевременно начатое лечение может приостановить этот процесс, продлить жизнь ВИЧ-положительных людей, но пока не существует вакцины и полное излечения от этой болезни невозможно.

Поэтому профилактика инфицирования является самой эффективной стратегией борьбы против распространения ВИЧ-инфекции. Каждый человек должен знать, как избежать заражения и не допустить дальнейшего распространения этой инфекции. Презервативы являются надежным средством предохранения от передачи ВИЧ половым путем. Использование только стерильных медицинских инструментов и проверенной донорской крови позволяет предотвратить заражение ВИЧ через кровь. Своевременно начатое и надлежащим образом проведенное профилактическое лечение беременной женщины и новорожденного способно практически полностью исключить вероятность передачи ВИЧ-инфекции от инфицированной матери ребенку.

В соответствии с белорусским законодательством каждый гражданин имеет право на добровольное и конфиденциальное обследование на ВИЧ-инфекцию с предоставлением консультации до и после обследования и на защиту от любых форм дискриминации в связи с ВИЧ-инфекцией.

Людам, живущим с ВИЧ или косвенно пострадавшим от этой болезни, нужны забота и сочувствие окружающих. Недопустимо ограничение прав людей, живущих с ВИЧ, на получение медицинской помощи, социальной поддержки, образования, а также в вопросах трудоустройства.

# КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ:

---

**ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЮТ ПРАВО ЗНАТЬ, ЧТО:**

- 1.** ВИЧ-инфекция – это хроническое, пока окончательно неизлечимое заболевание. ВИЧ передается через незащищенные половые контакты, переливание инфицированной крови, зараженные иглы и шприцы, а также от инфицированной женщины ее ребенку в период беременности, родов и во время грудного вскармливания.
- 2.** Эпидемия ВИЧ угрожает и взрослым, и детям. Всем необходимо знать о возможных путях инфицирования, соблюдать меры предосторожности и иметь доступ к тестированию и консультированию, профилактическим программам и, в случае необходимости, лечению и поддержке.
- 3.** При подозрении на инфицирование ВИЧ следует обратиться в лечебное учреждение по месту жительства или в отделы профилактики ВИЧ/СПИДа республиканского и областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для получения консультации и прохождения обследования.
- 4.** Снизить риск заражения ВИЧ половым путем можно, если ограничить близость одним неинфицированным половым партнером, сохраняющим вам верность, или правильно пользоваться презервативом при каждом половом контакте.



---

5.

ОСОБЕННО УЯЗВИМЫ ПЕРЕД ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ДЕВУШКИ.

6.

РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ МОГУТ ПОМОЧЬ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВИЧ.

7.

ВИЧ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ВО ВРЕМЯ РОДОВ ИЛИ ПРИ КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ.

8.

ВИЧ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ИГЛЫ ИЛИ ШПРИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НАРКОТИКОВ. ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТАКЖЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ И КОЛЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.

9.

ЛЮДИ С ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП), ОСОБЕННО УЯЗВИМЫ ПЕРЕД ВИЧ И С БОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬ ВИЧ ДРУГИМ. ИМ СЛЕДУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ ИППП.



## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

# ВИЧ и СПИД

## 1.

ВИЧ-инфекция — это хроническое, пока окончательно неизлечимое заболевание. ВИЧ передается через незащищенные половые контакты, переливание инфицированной крови, зараженные иглы и шприцы, а также от инфицированной женщины ее ребенку в период беременности, родов и во время грудного вскармливания.

ВИЧ поражает иммунную систему, которая защищает организм человека от болезней. Человек, инфицированный ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя достаточно хорошо в течение многих лет и даже не знать о наличии у себя инфекции. При этом вирус может передаваться от него другим людям при половых отношениях и контакте с кровью. Однако со временем ВИЧ разрушает иммунную систему настолько, что она теряет способность противостоять практически любым инфекциям, в том числе таким, с которыми здоровая иммунная система смогла бы справиться. Наличие тяжелых и длительных заболеваний свидетельствует о наступлении у ВИЧ-инфицированного человека стадии СПИДА.

У взрослых СПИД развивается в среднем через 7–10 лет после инфицирования. У детей раннего возраста он, как правило, развивается значительно быстрее. СПИД не поддается лечению, однако новые лекарственные препараты помогают людям, живущим с ВИЧ, сохранять здоровье и продлевать жизнь.

ВИЧ передается через незащищенные половые контакты при проникновении спермы, влагалищных выделений, крови инфицированного человека в организм его партнера.

Передача ВИЧ возможна также через нестерильные иглы и шприцы, другой медицинский инструментарий, бритвенные лезвия, ножи, иные предметы, используемые для срезания или прокалывания кожи. Передача ВИЧ также возможна в процессе переливания зараженной крови, поэто-

МУ ВСЯ КРОВЬ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ НА ВИЧ.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ ТЕЛ, ПРИ ОБЪЯТИЯХ, РУКОПОЖАТИИ, КАШЛЕ И ЧИХАНИИ. НЕВОЗМОЖНА ПЕРЕДАЧА ВИЧ ЧЕРЕЗ СИДЕНЬЕ УНИТАЗА, ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ, ТАРЕЛКУ, СТАКАН, КУХОННУЮ ПОСУДУ, ПОЛОТЕНЦЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАСЕЙН ИЛИ ОБЩЕСТВЕННУЮ БАНЮ. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕНОСЧИКАМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ КОМАРЫ И ДРУГИЕ НАСЕКОМЫЕ.

## 2.

ЭПИДЕМИЯ ВИЧ УГРОЖАЕТ И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТАМ. ВСЕМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ ИНФИЦИРОВАНИЯ, СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИМЕТЬ ДОСТУП К ТЕСТИРОВАНИЮ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ И, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЛЕЧЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ.

Младенцы и дети раннего возраста, инфицированные ВИЧ, нуждаются в хорошем питании, своевременной иммунизации и постоянном медицинском наблюдении. Вовремя начатое и правильно проводимое лечение позволит ВИЧ-положительному ребенку жить полноценной жизнью. Семье, в которой проживают ВИЧ-положительные родители и дети, может понадобиться помощь социальных служб, в том числе помощь на дому, особенно в период ухудшения состояния здоровья родителей.

- ◆ **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ У ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, ПОД ОПЕКУ РОДСТВЕННИКОВ ГОРАЗДО ПРЕДПОЧИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВА В ДОМ РЕБЕНКА ИЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ.**
- ◆ **НЕДОПУСТИМО НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТАМ И ВЗРОСЛЫМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ. ЗАКОНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗАПРЕЩЕНЫ ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ. РЕБЕНОК С ВИЧ ДОЛЖЕН ВЕСТИ ТАКОЙ ЖЕ ОБРАЗ ЖИЗНИ, КАК И ДРУГИЕ ДЕТИ ЕГО ВОЗРАСТА: ХОДИТЬ В ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛУ, ОБЩАТЬСЯ СО СВЕРСТНИКАМИ.**
- ◆ **РОДИТЕЛЯМ И ИХ ДЕТАМ НЕОБХОДИМА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ЧТОБЫ СОВЛАДАТЬ С ОСОЗНАНИЕМ И ПРИНЯТИЕМ СВОЕГО ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СТАТУСА.**

### 3.

При подозрении на инфицирование ВИЧ следует обратиться в лечебное учреждение по месту жительства или в отделы профилактики ВИЧ/СПИДа республиканского и областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для получения консультации и прохождения обследования.

Консультирование и обследование по поводу ВИЧ обеспечивают раннее выявление случаев ВИЧ-инфекции, позволяют инфицированным вовремя обратиться за получением необходимой медицинской помощи, социальной и психологической поддержки, а также предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ. Поскольку передача вируса от инфицированного человека возможна в любой момент, он должен использовать презерватив при каждом половом контакте и знать об уголовной ответственности за преднамеренное инфицирование других людей.

Если результат анализа крови на ВИЧ отрицательный, это означает либо отсутствие инфекции, либо слишком раннюю стадию заболевания – первые 3–6 месяцев после инфицирования, когда антитела к ВИЧ еще не выявляются. Поэтому обследование следует повторить через шесть месяцев после контакта с вероятным источником ВИЧ-инфекции.

Обследование на ВИЧ может помочь семейным парам в принятии решения о целесообразности рождения ребенка. При своевременно начатом и правильно проведенном профилактическом лечении беременной женщины и новорожденного передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку удастся предотвратить в 98 случаях из ста.

### 4.

Снизить риск заражения ВИЧ половым путем можно, если ограничить близость одним неинфицированным половым партнером, сохраняющим вам верность, или правильно пользоваться презервативом при каждом половом контакте.

Верность двух неинфицированных партнеров друг другу защитит обоих от ВИЧ-инфекции. С увеличением числа половых партнеров возрастает риск инфицирования ВИЧ.

Анализ крови на выявление антител к ВИЧ является наиболее точным способом диагностики ВИЧ-инфекции. Инфицированный человек внешне может выглядеть вполне здоровым.

Те, кто осознает риск инфицирования ВИЧ и важность защищенного секса (с использованием презерватива), могут проявлять неосмотрительность при вступлении в половой контакт после употребления алкоголя или наркотиков.

## 5.

ОСОБЕННО УЯЗВИМЫ ПЕРЕД ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ДЕВУШКИ

Девушки подвержены риску ВИЧ-инфицирования в большей степени по следующим причинам:

- ◆ Женщины биологически более восприимчивы к ВИЧ, чем мужчины; передача инфекции от мужчины женщине во время незащищенного полового акта происходит чаще, чем от женщины мужчине; вероятность травм половых органов во время полового акта, особенно первого, и, как следствие, проникновения ВИЧ у девушек выше, чем у зрелых женщин;
- ◆ Молодые девушки могут не осознавать риска или оказаться не в состоянии защитить себя от сексуальных домогательств и изнасилования;
- ◆ Взрослые мужчины нередко ищут связи с неопытными молодыми девушками, учитывая малую вероятность наличия у них ВИЧ-инфекции;
- ◆ Девушки и женщины имеют право на защиту от нежелательного или небезопасного секса. Родители и учителя должны учить юношей относиться к девушкам как к равным.

## 6.

Родители и учителя могут помочь молодым людям уберечь себя от ВИЧ.

Подростки и молодые люди должны осознавать риск инфицирования ВИЧ и знать о мерах предосторожности, которые им необходимо соблюдать, чтобы защитить себя от инфекции. Родители, опекуны, учителя, медицинские работники должны предоставлять им информацию о ВИЧ и других инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП), а также о риске, последствиях и мерах предотвращения незапланированной беременности.

Если родители испытывают неловкость при обсуждении этой темы со своим ребенком, они могут обратиться к другому лицу, умеющему разьяснять деликатные вопросы.

Большую роль в профилактике ВИЧ и ИППП играет обучение детей старшего школьного возраста жизненным навыкам, необходимым для сохранения собственного здоровья. Как показала практика, обучение жизненным навыкам приводит к тому, что подростки позднее начинают половую



жизнь и у них формируется ответственное отношение к собственному здоровью.

Важно информировать молодых людей о том, что вакцины или способа полного излечения от ВИЧ-инфекции не существует. Они должны понять, что профилактика – это единственное средство защиты от этого заболевания. Молодым людям следует также разъяснять их право на отказ от половой связи.

ВИЧ-инфекция пока полностью неизлечима, однако современная медицина дает ВИЧ-инфицированному человеку возможность прожить долгую и полноценную жизнь, работать, учиться, общаться с другими людьми. Молодые люди и дети должны также знать, что обычное повседневное общение с детьми или взрослыми, живущими с ВИЧ, не несет угрозы их здоровью. Люди, живущие с ВИЧ, нуждаются в заботе и поддержке.

# 7.

ВИЧ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ВО ВРЕМЯ РОДОВ ИЛИ ПРИ КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ.

Профилактика ВИЧ-инфекции у женщин является наиболее эффективным способом предупреждения передачи вируса от матери ребенку.

Сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции среди женского населения способствуют обеспечение прав женщин на самостоятельное принятие решений, их информирование о способах профилактики ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем (использование презервативов), а также своевременное выявление и качественное лечение этих инфекций. Женщина, узнавшая, что она инфицирована ВИЧ, нуждается в поддержке и консультации для принятия обдуманных решений на будущее.

Беременным женщинам следует знать, что риск инфицирования плода уменьшается, если принимать назначенные врачом лекарства (антиретровирусные препараты) и выбрать оптимальный способ родоразрешения.

Молодые матери должны быть проинформированы о высоком риске передачи ВИЧ-инфекции ребенку при кормлении грудью.

У ВИЧ-положительной женщины, не принимавшей антиретровирусных препаратов во время беременности и в родах, шансов родить здорового ребенка в три раза меньше.

## 8.

ВИЧ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ИГЛЫ ИЛИ ШПРИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НАРКОТИКОВ. ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТАКЖЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ И КОЛЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.

Лица, потребляющие инъекционные наркотики, а также их половые партнеры подвергают себя высокому риску инфицирования ВИЧ и должны использовать для инъекций только чистую иглу и шприц и не брать их у других.

Инъекции лекарственных препаратов всегда должен делать только медработник. Для прививок следует использовать одноразовые шприцы и иглы. Совместное использование игл и шприцев с любым человеком, включая членов семьи, может привести к заражению ВИЧ или другими опасными для жизни болезнями. Родители должны требовать от медработника использования одноразового инструментария. Инструменты, используемые в стоматологии, при нанесении татуировок, для пирсинга и лечения иглоукалыванием, безопасны, только если стерилизуются для каждого нового клиента.

## 9.

Люди с инфекцией, передаваемой половым путем, особенно уязвимы перед ВИЧ и с большей вероятностью могут передавать ВИЧ другим. Им следует безотлагательно обратиться за лечением ИППП.

Инфекции, передаваемые половым путем, распространяются при контакте спермы, вагинальных выделений и крови или участков тела в области гениталий (особенно если есть прыщи, потертости или порезы, зачастую вызываемые самой ИППП). Эти инфекции часто вызывают сильные боли и функциональные расстройства.

Любые ИППП значительно повышают риск инфицирования ВИЧ. Правильное использование качественных презервативов при каждом половом контакте может сдерживать распространение большинства ИППП, включая ВИЧ.

При подозрении на ИППП необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. При этом следует воздержаться от половых

контактов или практиковать только защищенный секс. При подтверждении диагноза ИППП необходимо сообщить об этом своим половым партнерам. Если оба партнера не прошли курс лечения от ИППП, они будут продолжать инфицировать друг друга. Большинство ИППП излечимы.